

마그비[®] 맥스 연질캡슐

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중

- 유효성분
 - 산하마그네슘 (KP) ----- 350mg (마그네슘으로서 211,09mg)
 - 토코페롤아세테이트 (KP) ----- 500mg (비타민E로서 500IU)
 - 베포티아민(비타민B1) (KP) ----- 50mg (티아민염산염으로서 36,15mg)
 - 리보플라빈(비타민B2) (KP) ----- 50mg
 - 니코틴아미드(비타민B3) (KP) ----- 10mg
 - 피리독신염산염(비타민B6) (KP) ----- 50mg
 - 시아노코발라민(비타민B12) (KP) ----- 0,5mg (시아노코발라민으로서 500µg)
 - 감마-오리자놀 (KP) ----- 5mg
- 첨가제(동물유래성분): 숙신산젤라틴(기원동물: 돼지, 사용부위: 가죽)
- 기타 첨가제: 콩기름, 황산, 레시틴, 폴리소르베이트80, 농글리세린, 정제수, 카카오색소, 치자청색소, 산화티탄

【성상】 황색의 내용물을 함유한 알갈색의 장방형 연질캡슐



【효능·효과】

- 다음경우의 비타민 E, B1, B2, B6의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 비타민E(토코페롤아세테이트):
 - 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증 (손발이 차가움)
 - 비타민B1(벤포티아민):
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(오(허리)통, 어깨결림 등)
 - 각기·눈의피로
 - 비타민B2(리보플라빈), 비타민B6(피리독신염산염):
 - 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

- ※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.
- ※ 그림과 같이 캡슐포장의 뒷부분을 확실하게 누르고 알약만 꺼내 복용합니다. 이때, 실수로 알루미늄 포장에 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.



【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 3) 심한 증상의 신(콩팥)부전 환자
 - 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장(콩팥)장애 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 임부
 - 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 9) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
 - 3) 요를 황색으로 변화시켜 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
 - 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여하고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

※ 연질캡슐이 녹거나 변형될 수 있으므로 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 보관하십시오.

【사용기한】 외부포장에 표기

※ 블리스터 포장의 제조번호 / 사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다.
 예) 제조번호 #23001, 사용기한 2025년 7월 1일인 경우 → "23001 2025,07,01"으로 표시

【포장단위】 10캡슐/상자(10캡슐/PTP X 1), 60캡슐/상자(10캡슐/PTP X 6), 120캡슐/상자(10캡슐/PTP X 6 X 2)

- ※ 이 제품은 정부의 "소비자분쟁해결 기준"에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서의 개정연월일 이후 변경내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부문서 개정연월일: 2023년 8월 30일



제조회·판매자

유한양행

본사: 서울특별시 동작구 노량진로 74
 공장: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지2로 219

홈페이지: www.yuhan.co.kr 소비자상담실: 080-024-1188(수신자 요금부담)

제조사: (주)알피바이오

경기도 화성시 마도면 청원산단 5길 60 (1층,2층일부,3층일부)