

원료약품 및 분량 이 약 1바이알(20mL) 중
 • 유효성분 : 글리세로인산마그네슘(BP) 1200mg (마그네슘으로서 150mg), 피리독신 염산염(비타민B₆)(KP) 75mg, 니코틴아미드(비타민B₃)(KP) 20mg, 리보플라빈포스페이트(비타민B₂)(KP) 763mg, 리보플라빈(로서 6mg) • 첨가제(보존제: 벤조산나트륨 12mg) • 기타 첨가제: 시트르산 수크랄로스, 아세실 팜칼륨, 스테아릴베이트, 카리멜락스, 조합향료 (믹스베리향(AHF-0799)), 정제수
생생 갈색의 바이알에 든 열은 갈색 ~ 갈색의 방향성 액체 ※ 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 등 - 인쪽 설명서 참조

제조번호 :
 사용기한 :

일반의약품 20mL

액상형으로 흡수가
 빠른 마그네슘 제제

마그비[®] 스피드^액

유한양행

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
제조·외판·판매자 : **㈜유한양행**
 공장: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219 홈페이지: www.yuhan.co.kr / 소비자 상담전화: 080-024-1188(수신자 요금부담)

제조자 : **㈜비보존제약**
 경기도 화성시 향남읍 계약공단길 34-40

※ 보관시에는 항상 바로 서워서 보관해 주십시오.

- 육체피로
- 체력저하
- 근육경련



외곽: 알미늄
 내곽: 고무



(01)08806421052534
 MGBS-L2-02

설명서 뒷면 참조
이제부터

마그비[®] 스피드^액

원료약품 및 분량 이 약 1바이알(20mL) 중 • 유효성분 : 글리세로인산마그네슘(BP) 1200mg (마그네슘으로서 150mg), 피리독신염산염(비타민B₆)(KP) 75mg, 니코틴아미드(비타민B₃)(KP) 20mg, 리보플라빈포스페이트(비타민B₂)(KP) 763mg, 리보플라빈(로서 6mg) • 첨가제(보존제: 벤조산나트륨 12mg) • 기타 첨가제: 시트르산 수크랄로스, 아세실팜칼륨, 스테아릴베이트, 카리멜락스, 조합향료(믹스베리향(AHF-0799)), 정제수 **생생** 갈색의 바이알에 든 열은 갈색 ~ 갈색의 방향성 액체 **[효능·효과]** ○ 다음경우의 비타민 B₆, B₃의 보급 • 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시 • 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. • **비타민B₆(리보플라빈포스페이트나트륨),** 비타민 B₆피리독신염산염 : 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 ○ 마그네슘결핍으로 인한 근육경련 **[용법·용량]** 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1바이알(20 mL) 복용합니다. 필요시 약간의 물에 희석(물계)하여 복용합니다. **[사용상의 주의사항]** 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 영아 3) 심한 중상의 신장(콩팥)부전 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오. 1) 인산염, 칼슘염, 경구약(는)용 테트라사이클린계 제제, 계산제 2) 레노도파 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 3) 심장순환기계기능 장애 환자 4) 신장(콩팥)장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 임부 7) 기억은 커리멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다. 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의

일반의약품

증상이 있을 경우 : 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하 2) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 3) 고용량 투여에 의한 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 5) 할알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여(함께복용)시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 6) 우발적으로 과량복용 한 경우 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. **기타 이 약의 복용 시 주의사항** 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다. 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오. 4. **저장상의 주의사항** 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 밀수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오. **[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 **[사용기한]** 외부포장에 표기 **[포장단위]** 1바이알, 6바이알(1바이알X6), 30바이알(1바이알X6)X5 ※ 이 제품은 정부의 '소비자분쟁해결기준'에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불받을 수 있습니다. ※ 이 문헌의 개정연월일 (2021.04.16) 이후 변경내용은 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다. ※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생된 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다. **제조·외판·판매자** : **㈜유한양행** 본사: 서울시 동작구 노량진로 74 / 공장: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219 홈페이지: www.yuhan.co.kr / 소비자상담전화: 080-024-1188 (수신자 요금부담) **제조자** : **㈜비보존제약** 경기도 화성시 향남읍 계약공단길 34-40